


Що мені необхідно робити після вакцинації?

- › В залежності від вакцини можуть бути необхідними дві дози: Перевірте, чи записані Ви на прийом для отримання другої дози у центрі вакцинації. Важливо дотримуватися терміну для підвищення ефективності вакцини.
- › Імунітет формується протягом перших тижнів після повної вакцинації. Це означає те, що Ви не будете одразу захищені від COVID-19!
- › Можливо, що Ви ще зможете заразити COVID-19 людей у Вашому оточенні. Продовжуйте дотримуватися карантинних обмежень.
- › Продовжуйте приймати участь у масштабному тестуванні, навіть якщо Ви вже вакциновані.




Що мені необхідно робити у випадку виникнення побічних ефектів?

- › Вакцини, як і будь-які інші лікарські препарати, можуть спричинити побічні ефекти.
- › Найчастіше повідомляється про наступні побічні ефекти: біль у місці ін'єкції, втома, головний біль, ломота, озноб, біль у суглобах і гарячка.
- › Якщо у Вас виникнуть побічні ефекти, **скажіть про це Вашому лікарю або зверніться до аптеки**. Це стосується будь-яких побічних ефектів, які, на Вашу думку, можуть бути пов'язані з введеною Вам вакциною. Ви також можете безпосередньо заявити про них через національну систему оповіщення: <https://gd.lu/dt7jsg>
- › Інформаційний лист про вакцину можна знайти на сайті covidvaccination.lu в рубриці **InfoVAXX**.



➤ **Не відмовляйтеся від звичайних дій продовжуйте дотримуватися карантинних обмежень.**



Інформація про тромбоз

Мінімальний ризик виникнення тромбозу після вакцинації вакцинами Vaxzevria® (AstraZeneca) або Janssen (Johnson & Johnson)

Спостерігалися випадки формування незвичайних кров'яних згустків з невисоким рівнем бляшок після вакцинації вакцинами Vaxzevria® або Janssen. Ризик таких побічних ефектів дуже низький, але Ви повинні стежити за появою вірогідних симптомів, для того щоб отримати швидку медичну допомогу для запобігання ускладнень і скорішого одужання.

Які вірогідні симптоми тромбозу, спричиненого вакцинацією?

- › задишка
- › біль у грудній клітці
- › набряк ніг
- › тривалий біль у животі
- › неврологічні симптоми, такі як, сильний або тривалий головний біль, порушення зору
- › дрібні кров'яні точки під шкірою поза місцем ін'єкції

Що мені необхідно робити у разі появи цих симптомів?

Ви повинні терміново звернутися до лікаря, якщо Ви помітите у себе один з вищезазначених симптомів протягом кількох тижнів після ін'єкції. Зверніться до Вашого лікаря. Ви також можете зателефонувати у чергову медичну службу.

В екстрених випадках телефонуйте за номером 112.

Ви також можете заявити про побічні ефекти через національну



систему оповіщення: <https://gd.lu/dt7jsg>