



اطلاعات مهم پس از واکسیناسیون



در صورت بروز عوارض جانبی پس از تزریق واکسن چه کاری باید انجام دهیم؟



پس از واکسن زدن چه کاری باید انجام دهیم؟

- ◀ بسته به واکسن تزریق شده، ممکن است 2 دوز لازم باشد: از دریافت وقت برای تزریق نوبت دوم در مرکز واکسیناسیون اطمینان حاصل کنید. رعایت فاصله بین دو تزریق برای اطمینان از بازدهی هر چه بیشتر واکسن مهم است.
- ◀ ایمنی طی چند هفته پس از تزریق دوز کامل واکسن ایجاد می شود.
- ◀ بنابراین بلافاصله پس از تزریق واکسن در برابر کوید-19 ایمن نخواهید بود.
- ◀ همچنین احتمال انتقال کوید-19 از شما به اطرافیان نیز وجود دارد.
- ◀ بنابراین به رعایت موارد پیشگیری از ابتلا به ویروس ادامه دهید.
- ◀ حتی اگر واکسن زده اید باز هم به انجام دادن تست کوید ادامه دهید.

- ◀ واکسن ها، مانند هر دارویی، ممکن است عوارض جانبی داشته باشند.
- ◀ بیشترین عوارض جانبی ناشی از تزریق واکسن از این قرار است: درد در محل تزریق، خستگی، سردرد، دردهای عضلانی، لرز، دردهای مفصلی و تب.

- ◀ در صورت بروز عوارض جانبی با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید. این رهنمود به هرگونه عارضه ای که فکر می کنید از تزریق واکسن ناشی شده است مربوط می شود. همچنین می توانید عوارض جانبی را از طریق سیستم ملی در سایت زیر اعلام کنید:



<https://gd.lu/3DL2gh>

اطلاعات مربوط به واکسن در بخش InfoVAXX در سایت gd.lu/3DL2gh در دسترس است.

عادت های خود را تغییر ندهید موارد پیشگیری از ابتلا به ویروس را همچنان رعایت کنید



اطلاعات مربوط به لخته شدن خون (ترومبوز)

در صورت مشاهده این علائم چه کاری باید انجام دهیم؟
در صورت مشاهده یکی از این علائم در طی چند هفته پس از تزریق واکسن، باید بلافاصله با پزشک اورژانس تماس بگیرید. لطفاً با پزشک خود نیز تماس بگیرید. همچنین می توانید با خدمات پزشکی شبانه تماس بگیرید.
در صورت اورژانس با 112 تماس بگیرید.
همچنین می توانید عوارض جانبی را از طریق سیستم گزارش ملی در سایت <https://gd.lu/3DL2gh> اعلام کنید.

علائم احتمالی ترمبوز ناشی از واکسیناسیون چیست؟

- ◀ تنگی نفس
- ◀ درد قفسه سینه
- ◀ پاهای متورم
- ◀ دردهای مداوم شکم (دل)
- ◀ علائم عصبی، مانند سردرد شدید یا مداوم یا مشکل بینایی
- ◀ لکه های ریز خون زیر پوست اطراف محل تزریق واکسن

خطر بسیار پایین ابتلا به ترمبوز در پی تزریق واکسن وکسزوریا (آسترازنکا) یا جانسن (جانسون و جانسون)

موارد غیر معمولی از لخته شدن خون با تعداد پلاکت پایین در افرادی که واکسن وکسزوریا یا جانسن را تزریق کرده اند رخ داده است.

خطر چنین عارضه جانبی بسیار کم است، اما شما باید نسبت به علائم احتمالی بیماری هشیار باشید تا بتوانید برای تسریع بهبودی و جلوگیری از عوارض پیچیده، درمان سریع پزشکی انجام دهید.

