


# Aşılama öncesi önemli bilgiler



## Aşılandıktan sonra ne yapmalıyım?

- Uygulanan aşıya göre, iki doz gerekli olabilir: Aşılama merkezinde ikinci doz olmak üzere randevunuzun olduğundan emin olunuz. Aşının yüksek bir oranda etkinliğini garanti etmek için süre önemlidir.
- Bağışıklık tam bir aşılama gerçekleştirildikten sonra ilk haftalar içerisinde gelişmektedir. Dolayısıyla COVID-19'a karşı hemen koruma altında değilsiniz!
- Hala çevrenizdekilere COVID-19'u bulaştırma olanağı bulunmaktadır. Koruyucu davranışları uygulamaya devam ediniz.
- Aşılanmış olsanız bile, Geniş Kapsamlı Teste katılmaya devam ediniz.

## Yan etki(ler) görülmesi halinde ne yapmalıyım?

- Aşılar diğer tüm ilaçlar gibi yan etkilere yol açabilir.
- En sıkça rapor edilen yan etkiler aşağıda sıralanmıştır: enjeksiyon yerinde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı, vücut ağrısı, ürperme, eklem ağrıları ve ateş.
- Bir veya birden fazla yan etki yaşıyorsanız, **bundan hekiminize veya eczacınıza bahsediniz**. Bu size uygulanan aşı ile bağlantısı olduğundan şüphe ettiğiniz her türlü yan etki için geçerlidir. Söz konusu yan etkileri ayrıca ulusal beyan sistemi aracılığıyla beyan edebilirsiniz: <https://gd.lu/3DL2gh>
- Aşı ile ilgili kullanma talimatları [covidvaccination.lu](https://gd.lu/3DL2gh), üzerinde **InfoVAXX bölümünde mevcuttur**.

Alışkanlıklarınızı değiştirmeyiniz, **önleyici davranışlara** uymaya devam ediniz.



# Trombozlar hakkında bilgiler

**Vaxzevria® (AstraZeneca) veya Janssen (Johnson & Johnson) ile aşılamayı takiben çok küçük bir tromboz riski vardır.**

Vaxzevria® veya Janssen aşısı ile aşılanmış olan kişilerde düşük bir plak oranı ile olağan dışı kan pıhtıları durumları vardır.

Bu tür bir yan etki riski çok düşüktür fakat iyileşmeyi kolaylaştırmaya ve komplikasyonları önlemeye yönelik olan hızlı bir tıbbi tedaviden yararlanabilmek için yine de olası belirtilere karşı temkinli olmaya devam etmelisiniz.

**Aşılanmanın yol açmış olduğu bir tromboz olası belirtileri nelerdir?**

- Soluksuzluk
- Göğüste ağrı
- Şişmiş bacaklar
- İsrarcı abdominal ağrı (karın)
- Şiddetli ve inatçı baş ağrıları veya görme bozukluğu gibi nörolojik belirtiler
- Enjeksiyon yerinin ötesinde deri altında minik kan lekeleri

**Bu belirtileri fark edersem ne yapmalıyım?**

Enjeksiyonu takiben haftalar içinde tarif edilen belirtilerden bir tanesine sahipseniz ivedilikle acilde bir hekimin görüşüne başvurmanız gerekir. Aile hekiminiz ile irtibata geçiniz. Ayrıca nöbetçi tıbbi hizmet ile de irtibata geçebilirsiniz.

**Acil durum halinde, 112'yi arayınız.**

Ayrıca <https://gd.lu/3DL2gh> ulusal beyan sistemi aracılığı ile istenmeyen yan etkileri bildirebilirsiniz

