

## أنا حامل.

### لماذا يجب أن أتلقى التطعيم؟

في حالة الإصابة بعدوى الكوفيد 19، تُظهر البيانات الحالية ضعفًا متزايدًا لدى النساء الحوامل، مع خطر مضاعف لتطور شديد للمرض لدى الأم، الإجهاض والحداج.

لهذا السبب يوصي المجلس الأعلى للأمراض المعدية في لوكسمبورغ (CSMI) بتلقيح النساء الحوامل ابتداءً من الأسبوع العاشر (10) لانقطاع الطمث.

تنطبق هذه التوصية حاليًا حصريًا على لقاحات نوع mRNA.



### ماذا علي أن أفعل في حالة حدوث آثار جانبية؟

يمكن للقاحات، مثل أي دواء آخر، أن تسبب آثارًا جانبية

الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي

آلام في موقع الحقن، إرهاق، صداع، آلام عضلية، قشعريرة، آلام في المفاصل وحمى

هذه الآثار مزعجة، لكنها تختفي من تلقاء نفسها بعد أيام فقط، وبالتالي فهي ليست خطيرة

قد تكون بعض الآثار الجانبية أكثر حدة، أو تستمر لفترة أطول، أو تظهر لفترة أطول بعد التطعيم

كما يمكن أن تكون أيضًا نادرة ومن نوع مختلف: هذه الآثار غير معروفة في وقت إتاحة اللقاح، ويطلق عليها باسم آثار غير متوقعة

من المهم إبلاغنا بهذه الآثار الخطيرة أو غير المتوقعة حتى نتأكد من التصرف وفقًا لذلك

إذا ظهرت لديك أي آثار جانبية، أبلغ بها طبيبك أو صيدليك

يمكنك أيضًا التصريح عنها مباشرة عبر نظام الإعلان الوطني

### حماية صحتي وصحة طفلي بعد التطعيم.

نريد أن نولي اهتمامًا خاصًا لصحتك وصحة طفلك الذي لم يولد بعد.

نتيجة لذلك، سيتم الاتصال بك من قبل مركز نانسي للحذر الدوائي

(Centre de Pharmacovigilance de Nancy)

في نهاية فترة الحمل من أجل التحقق من حالتك الصحية وحالة طفلك.

ملاحظة: لم يتم تسجيل أي خطر حتى الآن.

### ماذا علي أن أفعل بعد التطعيم؟

< تتطور المناعة خلال الأسابيع الأولى بعد التطعيم الكامل. أنت لست محميًا بشكل فوري!

< لذلك من المحتمل أنه لا يزال بإمكانك نقل كوفيد 19 للأشخاص من حولك. استمر في تطبيق إيماءات الحاجز.

< اعتمادًا على اللقاح المعطى، قد تكون هناك حاجة إلى أخذ جرعتين: تأكد من حصولك على موعد للجرعة الثانية في مركز التطعيم المهلة الزمنية مهمة لضمان فعالية عالية للقاح.

< استمر في المشاركة في الاختبار واسع النطاق، حتى إذا تم تطعيمك بشكل فعلي.

<https://gd.lu/5rGrFn>

