

أنا حامل.

لماذا يجب أن أتلقى التطعيم؟

في حالة الإصابة بعدوى الكوفيد 19، تُظهر البيانات الحالية ضعفًا متزايدًا لدى النساء الحوامل، مع خطر مضاعف لتطور شديد للمرض لدى الأم، الإجهاض والولادة المبكرة.

لهذا السبب يوصىي المجلس الأعلى للأمراض المعدية في لوكسمبورغ (CSMI) بتلقيح النساء الحوامل ابتداءً من الأسبوع العائشر (10) لانقطاع الطمث.

تنطبق هذه التوصية حاليًا حصريًا على لقاحات نوع mRNA.

حماية صحتي وصحة طفلي بعد التطعيم.

نريد أن نولي اهتمامًا خاصًا لصحتك وصحة طفلك الذي لم يولد بعد. نتيجة لذلك، سيتم الاتصال بك من قبل مركز نانسي للحذر الدوائي (Centre de Pharmacovigilance de Nancy) في نهاية فترة الحمل من أجل التحقق من حالتك الصحية وحالة طفلك.

ملاحظة: لم يتم تسجيل أي خطر حتى الآن.

ماذا علي أن أفعل بعد التطعيم؟

- تتطور المناعة خلال الأسابيع الأولى بعد التطعيم الكامل.
 أنت لست محميًا بشكل فوري!
- لذلك من المحتمل أنه لا يزال بإمكانك نقل كوفيد 19 للأشخاص
 من حولك. استمر في تطبيق السلوكيات الواقية.
- اعتمادًا على اللقاح المعطى، قد تكون هناك حاجة إلى أخذ جر عتين:
 تأكد من حصولك على موعد للجرعة الثانية في مركز التطعيم
 المهلة الزمنية مهمة لضمان فعالية عالية للقاح.
 - استمر في المشاركة في الاختبار واسع النطاق،
 حتى إذا تم تطعيمك بشكل فعلى.



ماذا علي أن أفعل في حالة حدوث آثار جانبية؟

- > يمكن للقاحات، مثل أي دواء آخر، أن تسبب آثارً أعراض جانبية.
 - > الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي:
- آلام في موقع الحقن، إر هاق، صداع، آلام عضلية، قشعريرة، آلام في المفاصل وحمى.
- هذه الأثار مز عجة، لكنها تختفي من تلقاء نفسها بعد أيام فقط، وبالتالي فهي ليست خطيرة.
 - قد تكون بعض الآثار الجانبية أكثر حدة، أو تستمر لفترة أطول، أو تظهر لفترة أطول بعد التطعيم.
- كما يمكن أن تكون أيضنًا نادرة ومن نوع مختلف: هذه الآثار غير معروفة في وقت إتلحة اللقاح، ويطلق عليها باسم آثار غير متوقعة.
- من المهم إبلاغنا بهذه الأثار الخطيرة أو غير المتوقعة حتى نتمكن من التصرف وقعًا لذلك .
 - إذا ظهرت لديك أي آثار جانبية، أبلغ بها طبيبك أو صيدليك.
 يمكنك أيضًا التصريح عنها مباشرة عبر نظام الإعلان الوطنى:

https://gd.lu/5rGrFn

> نشرة اللقاح متاحة على موقع INFOVAXX في قسم INFOVAXX.