

# Información importante para después de vacunarse



## ¿Qué debo hacer en caso de reacciones adversa(s)?



## ¿Qué debo hacer después de vacunarme?

- ▶ En función de la vacuna que se haya administrado, puede ser necesario recibir dos dosis: Asegúrese de que tiene cita en el centro de vacunación para la segunda dosis. El plazo es importante para garantizar una elevada eficacia de la vacuna.
- ▶ La inmunidad se desarrolla en el transcurso de las primeras semanas después de finalizar la vacunación completa. ¡De modo que la protección contra la COVID-19 no es inmediata!
- ▶ Es posible que siga transmitiendo la COVID-19 a las personas de su entorno. No deje de aplicar las medidas de prevención.
- ▶ Siga participando en los tests a gran escala aunque ya se haya vacunado.

- ▶ Al igual que cualquier otro tipo de medicamento, las vacunas pueden causar reacciones adversas.
- ▶ Los efectos más comunes son los siguientes: dolor en el punto de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolores articulares y fiebre.
- ▶ Si experimenta una o varias de estas reacciones adversas, **consulte con su médico o farmacéutico**. Esto es aplicable a cualquier efecto secundario que sospeche que pueda estar relacionado con la vacuna que le han administrado. También puede informar directamente de ello a través del sistema nacional de declaración: <https://gd.lu/3DL2gh>
- ▶ El prospecto de la vacuna está disponible en la página web [covidvaccination.lu](https://covidvaccination.lu), apartado **InfoVAXX**.



directamente de ello a través del sistema nacional de declaración: <https://gd.lu/3DL2gh>



No cambie sus hábitos, siga respetando las **medidas de prevención**



# Información sobre trombosis

## Existe un riesgo muy reducido de padecer trombosis tras recibir una vacuna Vaxzevria® (AstraZeneca) o Janssen (Johnson & Johnson)

Se han producido casos de coágulos de sangre inusuales con una tasa de plaquetas reducida en personas que habían recibido la vacuna Vaxzevria® o Janssen.

El riesgo de padecer este efecto secundario es muy reducido, pero aun así debe permanecer alerta ante posibles síntomas con objeto de acceder a un tratamiento médico rápido que facilite la curación y evite complicaciones.

## ¿Cuáles son los posibles síntomas de una trombosis causada por la vacuna?

- ▶ dificultad para respirar
- ▶ dolor en el pecho
- ▶ piernas hinchadas
- ▶ dolor abdominal persistente
- ▶ síntomas neurológicos, como dolores de cabeza intensos y persistentes o problemas de visión
- ▶ manchas de sangre minúsculas bajo la piel en sitios distintos al punto de inyección

## ¿Qué debo hacer si noto estos síntomas?

Si siente uno de los síntomas descritos en las semanas posteriores a la inyección debe consultar inmediatamente con un médico de manera urgente. Póngase en contacto con su médico de cabecera. También puede contactar con el servicio médico de guardia.

**En caso de emergencia llame al 112.**

También puede indicar los efectos secundarios adversos a través del sistema nacional de declaración: <https://gd.lu/3DL2gh>

