

Información importante para después de vacunarse



¿Qué debo hacer en caso de reacciones adversa(s)?



¿Qué debo hacer después de vacunarme?

- ▶ En función de la vacuna que se haya administrado, puede ser necesario recibir dos dosis: Asegúrese de que tiene cita en el centro de vacunación para la segunda dosis. El plazo es importante para garantizar una elevada eficacia de la vacuna.
- ▶ La inmunidad se desarrolla en el transcurso de las primeras semanas después de finalizar la vacunación completa. ¡De modo que la protección contra la COVID-19 no es inmediata!
- ▶ Es posible que siga transmitiendo la COVID-19 a las personas de su entorno. No deje de aplicar las medidas de prevención.
- ▶ Siga participando en los tests a gran escala aunque ya se haya vacunado.


- ▶ Al igual que cualquier otro tipo de medicamento, las vacunas pueden causar reacciones adversas.
- ▶ Los efectos más comunes son los siguientes: dolor en el punto de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolores articulares y fiebre.
- ▶ Si experimenta una o varias de estas reacciones adversas, **consulte con su médico o farmacéutico**. Esto es aplicable a cualquier efecto secundario que sospeche que pueda estar relacionado con la vacuna que le han administrado. También puede informar directamente de ello a través del sistema nacional de declaración: <https://gd.lu/3DL2gh>
- ▶ El prospecto de la vacuna está disponible en la página web covidvaccination.lu, apartado **InfoVAXX**.



directamente de ello a través del sistema nacional de declaración: <https://gd.lu/3DL2gh>



No cambie sus hábitos, siga respetando las medidas de prevención



Información sobre trombosis

Existe un riesgo muy reducido de padecer trombosis tras recibir una vacuna Vaxzevria® (AstraZeneca) o Janssen (Johnson & Johnson)

Se han producido casos de coágulos de sangre inusuales con una tasa de plaquetas reducida en personas que habían recibido la vacuna Vaxzevria® o Janssen.

El riesgo de padecer este efecto secundario es muy reducido, pero aun así debe permanecer alerta ante posibles síntomas con objeto de acceder a un tratamiento médico rápido que facilite la curación y evite complicaciones.

¿Cuáles son los posibles síntomas de una trombosis causada por la vacuna?

- ▶ dificultad para respirar
- ▶ dolor en el pecho
- ▶ piernas hinchadas
- ▶ dolor abdominal persistente
- ▶ síntomas neurológicos, como dolores de cabeza intensos y persistentes o problemas de visión
- ▶ manchas de sangre minúsculas bajo la piel en sitios distintos al punto de inyección

¿Qué debo hacer si noto estos síntomas?

Si siente uno de los síntomas descritos en las semanas posteriores a la inyección debe consultar inmediatamente con un médico de manera urgente. Póngase en contacto con su médico de cabecera. También puede contactar con el servicio médico de guardia.

En caso de emergencia llame al 112.

También puede indicar los efectos secundarios adversos a través del sistema nacional de declaración: <https://gd.lu/3DL2gh>

