


Bitne informacije pre vakcinacije


Šta trebam uraditi nakon vakcinacije ?




- › Prema primljenoj vakcini, mogu biti potrebne sve doze: Obavezno zakažite drugu dozu u centru za vakcinisanje. Vreme je bitno kako bi se osigurala visok nivo efikasnosti vakcine.
- › Imunitet se razvija u prvim nedeljama nakon celovite vakcinacije. Dakle, niste odmah zaštićeni od COVID-19!
- › Još uvek postoji mogućnost prenosa COVID-19 onima oko vas. Nastavite primenjivati mere zaštite.
- › Čak i ako ste vakcinisani, nastavite sudelovati u sveobuhvatnom testu.



Šta trebam uraditi ukoliko osetim nuspojave?



- › Vakcine kao i svi drugi lekovi može imati nuspojave.
- › Najčešće prijavljene nuspojave navedene su u nastavku: bol na mestu injekcije, umor, glavobolja, bolovi u telu, groznica, bolovi u zglobovima i temperatura.
- › Ako osetite jedan ili više nuspojava, **obavestite svog lečnika ili lekarnika**. To se odnosi na sve nuspojave za koje sumnjate da su povezane s vakcinom koje ste dobili. Ove nuspojave možete prijaviti i putem nacionalnog sistema izjava:  <https://gd.lu/3DL2gh>
- › Upute za upotrebu vakcine dostupne su na covidvaccination.lu u odeljku **InfoVAXX**.

➤ Ne menjajte svoje navike, nastavite se pridržavati **preventivnog ponašanja**



Informacije o trombozi

Postoji vrlo mali rizik od tromboze nakon vakcinacije Vaxzevria® (AstraZeneca) ili Janssen (Johnson & Johnson).

Ljudi koji su vakcinisani Vaxzevrijom® ili Janssenovom vakcinom imaju neobične slučajeve krvnih ugrušaka sa malim postotkom plaka.

Rizik od takvih neželjenih efekata vrlo je nizak, ali i dalje biste trebali paziti na moguće simptome kako biste imali koristi od brzog medicinskog tretmana koji olakšava zaceljivanje i sprečava komplikacije.


Koji su mogući simptomi tromboze izazvane vakcinacijom?

- › Prekid daha
- › Bol u grudima
- › Otežene noge
- › Stalni bol u truhu (stomaku)
- › Neurološki simptomi kao što su jake i trajne glavobolje ili poremećaji vida
- › Sitne mrlje krvi ispod kože iznad mesta injekcije

Šta da radim ako primetim ove simptome?

Ako imate bilo koji od opisanih simptoma u roku od nekoliko nedelja nakon injekcije, odmah potražite savet lečnika. Obratite se svom porodičnom lekaru. Takođe možete kontaktirati dežurnu medicinsku službu.

U hitnim slučajevima nazovite 112.

Neželjene nuspojave možete prijaviti i putem nacionalnog sistema izveštavanja:  <https://gd.lu/3DL2gh>