

## استبيان ما قبل التطعيم - يتم استكماله عند أخذ موعد

إخلاء المسؤولية: التطعيم ضد كوفيد-19 غير مرخص به حالياً للأطفال وغير منصوح به للنساء الحوامل والمرضعات. كإجراء احترازي، يوصى بتجنب الحمل لمدة شهرين بعد التطعيم بالجرعة الثانية. إذا كنت تعاني من أي من المشكلات الصحية التالية، يرجى الاتصال بطبيبك قبل أخذ موعد، ثم وضع علامة في المربع (المربعات) المناسبة:

- رد فعل خطير بعد تلقي التطعيم
- السرطان أو اللوكيميا أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أو انخفاض كبير في الدفاعات المناعية
- الأمراض المزمنة الأخرى للجهاز المناعي (التهاب المفاصل الروماتويدي، مرض كرون، الصدفية، أمراض المناعة الذاتية الأخرى)
- اضطراب التخثر أو العلاج بأدوية لتسييل الدم (مضادات التخثر بخلاف الأسبرين)

المعلومات التالية مطلوبة للاستعلام فقط. إنها مهمة لمراقبة فعالية التطعيم لفئات معينة من الأشخاص.

• الوزن  • الطول

• لقد ثبتت إصابتك بـ كوفيد 19 منذ بداية الوباء:

○ نعم ○ لا

إذا كان الأمر كذلك، التاريخ التقريبي:

• شهر  • سنة

عند اختيار تاريخ RV الخاص بك، تأكد من أنك لم تتلقى تطعيمًا آخر (مثل التيتانوس والأنفلونزا) في الأسبوعين الماضيين.