

پرسشنامه پیش از واکسیناسیون - هنگام تعیین وقت کامل شود

سلب مسئولیت : واکسیناسیون در برابر کوید-19 در حال حاضر برای کودکان و زنان باردار و شیرده توصیه نمی شود. برای احتیاط، توصیه می شود تا دو ماه پس از تزریق دوز دوم واکسن از بارداری جلوگیری کنید.

اگر به یکی از مشکلات سلامتی اشاره شده در زیر مبتلا هستید، قبل از تعیین وقت واکسیناسیون با پزشک خود تماس بگیرید، سپس کادر(های) مربوطه را علامت بزنید:

- واکنش شدید پس از واکسن زدن
- سرطان، سرطان خون، ایدز، یا ضعف قابل توجه سیستم ایمنی بدن
- سایر بیماری های مزمن سیستم ایمنی (آرتریت روماتوئید ، بیماری کرون ، پسوریازیس ، سایر بیماری های خود ایمنی)
- مشکل انعقاد خون یا درمان با داروهای رقیق کردن خون (داروهای ضد انعقاد خون به جز آسپیرین)

داده های زیر برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز است. این اطلاعات برای نظارت بر کارایی واکسن بر روی گروه های خاصی از افراد دارای اهمیت هستند.

• وزن • قد

- از ابتدای شیوع این بیماری همه گیر شما به کوید-19 مبتلا شده اید:
 - بله
 - خیر

اگر مبتلا شده اید، تاریخ تقریبی:

• ماه • سال

هنگام انتخاب وقت واکسیناسیون دقت کنید در دو هفته قبل از تاریخ مورد نظر واکسن دیگری (به عنوان مثال کزاز، آنفلوآنزا) نزده باشید.